

# NUTRITION ENTERALE

## PREVENTION DES INCIDENTS POSSIBLES DE LA POSE DE LA SONDE

INCIDENTS	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
<b>Absence de coopération</b>	Expliquer le soin	Présence de 2 personnes pendant de la pose
<b>Douleur</b>	Introduire doucement la sonde sans forcer	Surveiller la disparition de la douleur à la pose de la sonde
<b>Enroulement de la sonde</b>	Placer la sonde en silicone au réfrigérateur avant la pose Regarder dans la bouche au moment de la pose	Retirer et reposer la sonde
<b>Hémorragie nasale extériorisée par la bouche</b>	En fonction du contexte clinique, vérifier le bilan d'hémostase, lubrifier la sonde, introduire doucement la sonde	Retirer la sonde, comprimer la narine, appeler le médecin
<b>Obstruction orifices de la sonde</b>	Nettoyage de la narine au sérum physiologique isotonique	Oter la sonde, la désobstruer et la reposer
<b>Régurgitation</b>	Pose de la sonde 4 à 6 heures après le dernier repas	Installer le patient en position latérale de sécurité
<b>Toux, larmoiments</b>	Position demi-assise, faire déglutir avec un peu d'eau, si possible	Retirer la sonde, la réintroduire, vérifier systématiquement la bonne position de la sonde