

## PRÉVENTION, DÉPISTAGE ET RISQUES AGGRAVÉS

# La prise en charge du tabagisme en péri-opératoire dispose de recommandations actualisées



La Société française d'anesthésie-réanimation (Sfar) propose des recommandations actualisées sur la prise en charge du tabagisme en péri-opératoire.

"Je suis opéré, j'arrête de fumer". Sous ce slogan, la Société française d'anesthésie-réanimation (Sfar) mène sa propre campagne de soutien à l'arrêt du tabagisme avant l'anesthésie et la chirurgie. Dans ce cadre et en lien avec la campagne anti-tabac des pouvoirs publics, la société savante a actualisé ses recommandations sur la prise en charge du tabagisme en période péri-opératoire (les précédentes dataient de 2005). Elle les a présentées à l'occasion de son congrès annuel, organisé à Paris du 22 au 24 septembre.

## Recommandations en cinq points

Cinq chapitres sont inscrits à la table des matières des recommandations de la Sfar :

- > intérêt d'une prise en charge spécifique de l'arrêt du tabagisme préopératoire ;
- > délai minimal efficace pour l'arrêt préopératoire du tabac ;
- > rôle en consultation du chirurgien, de l'anesthésiste-réanimateur et des soignants face à un patient tabagique ;
- > impact du tabagisme passif chez l'enfant en période péri-opératoire ;
- > cigarette électronique et tabagisme préopératoire (cette partie est la moins stable étant donné les avis contradictoires constatés actuellement ; cela du fait de la jeunesse de la e-cigarette).

**[> VOIR LES RECOMMANDATIONS SUR LA PRISE EN CHARGE DU TABAGISME EN PERI-OPERATOIRE ACTUALISEES](#)**

Dernière mise à jour le 26 septembre 2016

[< PRÉCÉDENT](#)

[TOUTES LES ACTUALITES](#)

[SUIVANT >](#)