

Hormonothérapie - Effets indésirables

Une hormonothérapie peut être accompagnée d'effets indésirables :

1. CANCERS HORMONOSENSIBLES DE LA PROSTATE (d'après INCa)

Hormone impliquée : **testostérone**

| Types d'hormonothérapie | Principaux médicaments utilisés (principe actif) |
|---|---|
| Effets indésirables des <u>Anti-androgènes</u> | Flutamide Bicalutamide Nilutamide Acétate de cyprotérone |
| Effets indésirables des <u>Analogues de la LHRH</u> | Leuproréline Goséréline Buséréline Triptoréline |

2. CANCERS HORMONOSENSIBLES DU SEIN (d'après INCa)

Hormones impliquées : **oestrogènes, progestérone**

| Types d'hormonothérapie | Principaux médicaments utilisés (principe actif) |
|---|--|
| Effets indésirables des <u>Anti-oestrogènes</u> | Tamoxifène |
| Effets indésirables des <u>Analogues de la LHRH</u> | Leuproréline Goséréline |
| Effets indésirables des <u>Anti-aromatases</u> | Létrozole Anastrozole Exémestane |

Pour les cancers du sein traités par hormonothérapie :

- Pendant la période reproductive, l'utilisation d'une méthode contraceptive est vivement recommandée pendant ou juste après une hormonothérapie par anti-œstrogènes.
- En cas de projet de grossesse, il est conseillé d'attendre un certain temps après la fin de l'hormonothérapie et de préconiser un entretien avec l'oncologue qui pourra orienter la patiente.

3. CANCERS HORMONOSENSIBLES DE L' ENDOMETRE (d'après INCa)

Hormones impliquées : **oestrogènes, progestéone**

| Types d'hormonothérapie | Principaux médicaments utilisés (principe actif) |
|---|--|
| Effets indésirables des Anti-progestatifs | Acétate de médroxyprogestéone |

Informations patients

Fiche "[Soigner un cancer par homonothérapie](#)"

Sites utiles

[Base de données publique des médicaments](#)

Dernière mise à jour le 17 novembre 2016